

# KÚFSKEL – OCEAN QUAHOG

## *Arctica islandica*

### RÁÐGJÖF – ADVICE


Hafrannsóknastofnun leggur ekki fram tillögur um hámarksafli á kúfskel fiskveiðiárið 2019/2020. Ráðgjöf verður næst veitt að afloknum rannsóknum á þeim svæðum sem fyrirhugað er að nýta.

*MFRI does not recommend a TAC for the 2019/2020 fishing year. Future catch advice will be given following research in areas to be utilized.*

### VEIÐAR – THE FISHERY

Veiðar á kúfskel voru stundaðar með hléum árin 1988–1999 á svæðinu frá Breiðafirði að Skagatá. Landaður afli var á bilinu 1100–7700 tonn. Veiðar á svæðinu frá Skagatá austur um að Ingólfshöfða hófust 1996 og var afli til ársins 2005 á bilinu 700–14 400 tonn. Veiðar hafa verið óverulegar frá 2009 vegna markaðsaðstæðna. Árið 2009 lögðust allar veiðar með vatnsprýstiplógi af, en í staðinn hefur verið notaður lítill tannplógur og hefur aflinn verið á bilinu 1–30 tonn.

*Fishing for ocean quahog was conducted intermittently in NW Iceland in 1988–1999. Landings ranged from 1100–7700 tonnes annually. Fishing in the NE area started in 1996 and yielded 700–14 400 tonnes annually until 2005. Since 2009, only a minor fishery has been conducted due to difficult markets. In 2009, hydraulic dredge fishing ceased, being replaced by a dry dredge fishery taking 1–30 tonnes annually.*



**Kúfskel.** Afli eftir svæðum og veiðisvæði árin 2000–2009 (t/sjm<sup>2</sup>).

**Ocean quahog.** Catches by area, and fishing grounds in 2000–2009 (t/sjm<sup>2</sup>).

### AÐRAR UPPLÝSINGAR – OTHER INFORMATION

Kúfskel er langlíf og hægvaxta tegund og því þarf að fara varlega við nýtingu hennar.

*Ocean quahog is a long-lived and slow-growing species and is therefore vulnerable to heavy exploitation.*